

Observation d'une forme peu banale de Petit Nacré

(*Issoria lathonia*, Lepidoptera, Nymphalidae)

par Albert Pucci

Voici la description d'une forme individuelle originale d'*Issoria lathonia*, observée à Amifontaine (Aisne), le 28 août 1995 à proximité de Buddleias en fleurs par une belle journée ensoleillée et beaucoup de vent.

L'individu observé est un mâle frais de 40 mm d'envergure dont les antennes semblent un peu plus foncées que sur les individus normaux.

Comparativement à la forme typique de l'espèce, les ailes antérieures présentent sur leur face supérieure une large coloration centrale brune noirâtre uniforme parfaitement délimitée ménageant l'aire submarginale fauve dans laquelle les taches noires habituelles sont plus ou moins jointives, et d'autre part une coloration normale dans l'aire basale de l'aile et sur leur bord interne. On observe une coloration normale des nervures.

Les ailes postérieures présentent sur leur face supérieure une coloration brune noirâtre plus diffuse qu'aux antérieures et localisée dans l'aire postmédiane sur toute sa longueur, et les aires discale et submarginale dans leur partie apicale. L'aire basale et le bord abdominal présentent une coloration normale, de même que les nervures.

Sur leur face inférieure, les ailes antérieures présentent une aire sombre similaire à la face supérieure, mais fragmentée avec une forte atténuation rougeoyante en s'approchant des nervures qui gardent leur aspect normal. Les taches nacrées sont peu apparentes.

La face inférieure des ailes postérieures présente des macules nacrées bien délimitées sur un fond légèrement plus sombre que sur les individus normaux. Les taches de l'aire submarginale semblent plus ternes.

L'espèce typique semblait avoir disparu depuis plusieurs années, et ce n'est qu'en août 1995 que quelques exemplaires sont réapparus dans la commune et ses environs.

L'exemplaire présenté dans cet article est déposé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.



Albert Pucci

27, rue des Mégrets - 02190 Amifontaine


NDLR

Plusieurs ouvrages mentionnent l'existence de nombreuses variations chez cette espèce, dont la plus remarquable est la forme *valdensis* (très rare) qui possède des ailes uniformément noires avec des taches brillantes contiguës à la face inférieure. La forme illustrée dans cet article semble être un intermédiaire entre la forme typique de l'espèce et cette forme individuelle *valdensis*.

L'observation de cette forme individuelle ne semble pas liée à la réapparition de l'espèce sur le site car le Petit Nacré est réputé être un migrateur régulier. L'Aisne se situe en effet sur la frange de répartition de l'espèce en Europe de l'Ouest et subit de ce fait des fluctuations importantes de populations selon les conditions climatiques annuelles.



La forme individuelle décrite d'*Issoria lathonia* (recto et verso) (Clichés R. Coutin - OPIE)



La forme typonominale d'*Issoria lathonia* (recto et verso) (Clichés R. Coutin - OPIE)