

UN GYNANDROMORPHE DE *Porthetria (Lymantria) dispar* L. (*Lepidoptera, Lymantriidae*)

par Bernard et Stéphane Vincent

Un soir de Juillet 1991, alors que nous effectuions une chasse de nuit au piège lumineux aux alentours de Grasse (Alpes Maritimes), quelle ne fût pas notre surprise, après avoir capturé quelques *Marumba quercus* (*Lepidoptera, Sphingidae*) et diverses autres espèces d'Hétérocères, de voir se poser sur le drap un individu tout à fait particulier de *Porthetria dispar*. En effet, vers 23 H 45 ce n'est pas une femelle, ni un mâle de l'espèce que nous eûmes l'étonnement de voir, mais un gynandromorphe quasiment bipartite sur toute la longueur du corps. Seul l'abdomen semblait majori-

tairement femelle. En vue dorsale la répartition du phénotype mâle est exclusivement à gauche.

Cette anomalie de la nature n'est cependant pas rare et facilement décelable chez *Porthetria dispar* lié au grand dimorphisme qui existe entre les phénotypes mâle et femelle.

Les individus gynandromorphes ne sont généralement pas fertiles et font encore un sujet de recherche privilégiée en tératologie (*teratos* = monstre). ■

Bernard & Stéphane Vincent
2, place Lionel Lecouteux
72000 LE MANS



Gynandromorphe de *Porthetria dispar*. (Cliché B & S. Vincent)